

Anexo 1

Flora arbórea

Anexo 1 – Lista de espécies arbóreas identificadas na Mata Nacional do Choupal.

(Trabalho desenvolvido por Sandra Lopes – 2004, aluna do Instituto Botânico da Universidade de Coimbra, em colaboração com o ICNB, que desenvolveu o seu estágio final de curso na Mata Nacional do Choupal)

Família	Espécie	Nome vulgar	Origem
Araucariaceae	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	araucária-de-Norfolk	Ilha Norfolk (E Austrália)
	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Carrière	cedro-do-atlas	Cordilheira do Atlas (N África)
Pinaceae	<i>Abies numidica</i> Carrière	abeto-da-argélia	NE Argélia
	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D.Don) G.Don	cedro-do-himalaia	NW Himalaias, Afeganistão
	<i>Abies numidica</i> Carrière	abeto-da-argélia	NE Argélia
Cephalotaxaceae	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook.	teixo-da-china	C China
Taxodiaceae	<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl.	sequoia	Califórnia
	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	cedro-do-japão	China, Japão
	<i>Cupressus bakeri</i> Jeps.	N Califórnia
	<i>Calocedrus decurrens</i> (Torr.) Florin	cedro-branco-da-califórnia	W EUA
	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	biota-da-china, tuia-da-china	China
Cupressaceae		cedro-de-goa, cedro-do-buçaco, cipreste	América central: Costa Rica, Guatemala, México
	<i>Cupressus lusitanica</i> Miller	cipreste-do-buçaco, falso-cedro-do-buçaco	El salvador, Nicarágua
	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipreste	Irão, Síria, Chipre
Ginkgoaceae	<i>Ginkgo biloba</i> Kaempf. ex L.	ginkgo	E China
			SE Ásia:
Podocarpaceae	<i>Podocarpus neriifolius</i> D.Don	Himalaias, Ilhas Fiji
	<i>Podocarpus totara</i> G.Ben ex D.Don	totara	Nova Zelândia
	<i>Acacia dealbata</i> Link	acácia, acácia-dealbada	SE Austrália
	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	acácia-mimosa	Tasmânia
Leguminosae		acácia, acácia-austrália	S e E Austrália
	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	austrália	Tasmânia
		espinheiro-da- virgínia	C e E América do Norte
	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K. Koch	"cafeeiro-de-kentucky"	C e E de América de Norte
	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	falsa-acácia	C e E EUA
	acácia-bastarda		
	<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	Tipuana	América do Sul : Bolívia, NW Argentina
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L.	bôrdo, bordo-comum	Europa, W Ásia
	<i>Acer negundo</i> L.	bordo-negundo, bordo	C e N EUA

	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	falso-plátano	C e S da Europa
	<i>Acer pseudoplatanus</i> L. 'Purpurascens'	falso-plátano	hortícola
Hippocastanaceae	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	castanheiro-da-índia	Península Balcânica
Aucubaceae	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. 'Variegata'	planta-do-pó-dourado	hortícola
Sterculiaceae	<i>Brachychiton populneus</i> (Schott & Endl.) R.Br.	árvore-do-fogo	E e S Austrália
	<i>Callistemon macropunctatus</i> (Dum.-Cours.) Cours	Austrália
	<i>Callistemon rigidus</i> R.Br.	SE Austrália (New South Wales)
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	eucalipto-comum	Tasmânia
	<i>Eucalyptus saligna</i> Sm.	E Austrália (Queensland)
	<i>Eucalyptus viminalis</i> Labill.	Eucalipto-com-folhas-de-vimieiro	S e E Austrália
	<i>Syzygium paniculatum</i> Gaertn.	E Austrália
Theaceae	<i>Camellia japonica</i> L.	cameleira, japoneira roseira-do-japão	Japão, Coreia, China
Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Casuarina	N e NE Austrália
Bignoniaceae	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	catalpa, catalpa-comum	E EUA
	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	Jacarandá	América do Sul: Argentina, Bolívia
	<i>Celtis australis</i> L.	lódão-bastardo	Região mediterrânica
Ulmaceae	<i>Celtis occidentalis</i> L.	lodo-bastastardo, lódão-americano	América do Norte
	<i>Ulmus minor</i> Mill.	ulmeiro, negrilho, Lomegueiro	N África, Ásia Ocidental
	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	marmeleiro-do-japão	Japão
	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira-do-japão	China central
	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	esponjeira-do-japão	C e W China, Japão
Rosaceae	<i>Malus pumila</i> Mill.	Macieira	Europa, Ásia menor
	<i>Prunus domestica</i> L.	ameixeira Ameixieira ameixoeira	SW Ásia ou Cáucaso
	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	loireiro-real loureiro-cerejo loureiro-real louro-cerejo louro-inglês loureiro-romano	Cáucaso Península Balcânica Turquia Irão
Lauraceae	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	canforeira, alcanfoeira	China, Japão, Taiwan
Rutaceae	<i>Citrus aurantium</i> L.	laranjeira-azeda laranjeira-da-china	SE China

	<i>Citrus x paradisi</i> Macfad	toranja, grapefruit	híbrido
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i> L.	Aveleira	Europa, Ásia ocidental
Ebenaceae	<i>Diospyrus lotus</i> L.	ébano-verde	Ásia
	<i>Diospyrus virginiana</i> L.	E e SE EUA
Araliaceae	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne & Planch	Japão, S Coreia
	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl	freixo, freixo- comum, freixo-de- folhas-estreitas	S Europa, N África
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	freixo, freixo- europeu	Europa e Ásia
	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	quina-da-europa	Região mediterrânica
Proteaceae	<i>Grevillea robusta</i> A.Cunn. ex R.Br.	aderno-de-folhas- largas Grevílea	SE Austrália
		aquifólio, azevinho azevinho- espinhoso espinho-sempre- verde	Região mediterrânica
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L.	loureiro-bravo pica-folha(s), pica- rato visqueiro, xardo, zebro	
	<i>Juglans nigra</i> L.	nogueira- americana nogueira-preta	América do Norte
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	nogueira nogueira-comum	SE Europa, Himalaias, China
		loireiro-vulgar, loureiro	
Lauraceae	<i>Laurus nobilis</i> L.	loureiro-comum loureiro-dos-poetas loureiro-vulgar louro, sempre- verde	Região mediterrânica
Magnoliaceae	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipeiro tulipeiro-da-virgínia	E EUA
Magnoliaceae	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnólia, magnólia-de-flores- grandes	SE Estados Unidos
	<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod.	híbrido
	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid.	Arkansas, Oklahoma, Texas (S América do Norte)
Moraceae	<i>Morus alba</i> L.	amoreira-branca moreira-branca	China e Japão

	<i>Morus nigra</i> L.	Amoreira amoreira-da-horta. amoreira-preta, amoreira-negra	Pérsia
Palmae	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. ex Chabaud	palmeira-das- canárias	Ilhas Canárias
Graminae	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zucc.	bambu-gigante	China
	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) Ainton.fil.	faia-da-holanda faia-do-norte pitósporo-da-china	E China, S Japão
Pittosporaceae	<i>Pittosporum undulatum</i> Vent.	árvore-de-incenso faia-do-norte, incenso, incenso- pitósporo falsa-árvore-do- incenso	SE Austrália
	<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex. Münchh	plátano-comum	Híbrido
Platanaceae	<i>Platanus orientalis</i> L.	plátano-de-londres coquilheiro coquilho plátano plátano-do-oriente	SE Europa, Ásia menor
	<i>Populus nigra</i> L.	choupo-negro, álamo-negro	Europa, Ásia, N África
Salicaceae	<i>Salix alba</i> L.	salgueiro-branco Sinceiro vimeiro-branco	Europa, Ásia, N África
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	carvalho-alvarinho carvalho-comum	Europa, Ásia ocidental
	<i>Weigela japonica</i> Thunb.	Japão
Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	Canineiro flor-de-sabugeiro Galacrista sabugo, sabugueiro Sabugueiro-preto Sabugueiro-negro	Europa, SW Ásia, N África
Asteraceae	<i>Senecio petasitis</i> DC.	S México
	<i>Tilia x europaea</i> L.	tília-europeia	Europa
	<i>Tilia petiolaris</i> DC.	Caucaso
Tiliaceae	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	tília-de-folhas- grandes	C e S Europa, W Ásia
	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	tília-prateada	Península Balcânica