

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Res / Endlb	-	-
categoria	NT	-	-

### Taxonomia

Amphibia, Anura, Discoglossidae.

### Tipo de ocorrência

Residente. Endémica da Península Ibérica.

### Classificação

QUASE AMEAÇADO – NT (B2ab(ii,iii,iv,v))

Fundamentação: A espécie apresenta uma área de ocupação entre 1.400 e 2.800 km<sup>2</sup>. Admite-se que apresente fragmentação elevada e um declínio contínuo da área de ocupação, da quantidade e qualidade do habitat, do número de localizações e do número de indivíduos maduros.

### Distribuição

Espécie endémica da metade oeste da Península Ibérica.

Em Portugal ocorre em todo o país, maioritariamente em núcleos populacionais fragmentados (Ferrand de Almeida *et al.* 2001), correspondendo a área de distribuição da espécie, a nível nacional, a cerca de 25% da área global (Godinho *et al.* 1999, Martínez-Solano 2002).

### População

Não existem estimativas da densidade populacional em Portugal. No entanto, admite-se que o número de indivíduos maduros seja superior a 10.000.

### Habitat

Esta espécie ocorre geralmente nas imediações de pequenas massas de água com uma certa cobertura herbácea, preferindo terrenos encharcados, tais como prados e lameiros. Pode ser encontrada durante a reprodução em charcos sazonais ou permanentes, ribeiros, nascentes, canais de rega e em lagoas litorais, resistindo a níveis de salinidade relativamente elevados.

*Discoglossus galganoi* Capula, Nascetti,  
Lanza, Bullini & Crespo, 1985



anfíbios

## Rã-de-focinho-pontiagudo



### Factores de Ameaça

Os principais factores de ameaça são a perda, fragmentação e degradação de habitat por factores antropogénicos, nomeadamente devido: (i) ao abandono da agricultura tradicional com a consequente perda de lameiros e massas de água para reprodução; (ii) à agricultura intensiva; (iii) à substituição dos seus habitats por florestas de produção; (iv) à construção de infra-estruturas industriais e urbanísticas, (v) à poluição aquática e (vi) aos incêndios florestais.

A introdução de espécies não-indígenas invasoras, predadoras de ovos e larvas de anfíbios, tais como o lagostim-vermelho da Louisiana *Procambarus clarkii* constitui um factor de ameaça adicional de magnitude desconhecida. Acrescem ainda factores biológicos comuns à maioria dos anfíbios, como uma capacidade de dispersão limitada e elevada mortalidade juvenil.

### Medidas de Conservação

As medidas de conservação mais importantes para esta espécie devem consistir na protecção dos seus habitats, nomeadamente áreas de lameiros e prados alagados, bem como dos charcos que utilizam para a sua reprodução. Além disso,



*Discoglossus galganoi* Capula, Nascetti,  
Lanza, Bullini & Crespo, 1985

Rã-de-focinho-pontiagudo

considera-se também importante combater a introdução e expansão de espécies não-indígenas predadoras, nomeadamente o lagostim-vermelho da Louisiana, e adoptar medidas eficazes para prevenção dos incêndios florestais.

#### Outra bibliografia consultada

Oliveira & Crespo (1989).