

	CONTINENTE	AÇORES	MADEIRA
ocorrência	Res	-	-
categoria	VU	-	-

Taxonomia

Mammalia, Chiroptera, Vespertilionidae.

Tipo de ocorrência

Residente.

Classificação

VULNERÁVEL – VU

Fundamentação: A espécie tem uma área de ocupação reduzida (inferior a 10 km²) e um declínio continuado da qualidade do habitat.

Distribuição

Encontra-se da Irlanda ao Noroeste de África e, para leste, até aos Montes Urais, ao Próximo Oriente e ao Turquemenistão (Bogdanowicz 1999a).

Em Portugal, distribui-se por todo o território continental (Palmeirim *et al.* 1999).

População

A população portuguesa é constituída por poucos milhares de indivíduos, agrupados durante a época de criação em talvez menos de duas dezenas de colónias.


Na Europa Central, é uma espécie relativamente comum, parecendo estar a regredir em algumas regiões (Palmeirim *et al.* 1999). No entanto, a população portuguesa da espécie aparenta estar a aumentar (Rodrigues *et al.* 2003).

Habitat

Durante a época de criação ocupa cavidades subterrâneas (Benzal *et al.* 1991, Palmeirim *et al.* 1999) mas pode também criar em fendas de edifícios e de árvores (Swift 1997, Bogdanowicz 1999a). Hiberna sobretudo em grutas e minas (Bogdanowicz 1999a).

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Morcego-de-franja



O morcego-de-franja caça nas margens de zonas florestadas próximo de áreas com vegetação herbácea (Arlettaz 1996, Swift 1997). Caça também sobre lagos e rios (Jong 1995; Vaughan *et al.* 1997).

Factores de Ameaça

O reduzido efectivo da espécie, associado à baixa fertilidade característica dos morcegos, torna-a particularmente frágil. Também o carácter colonial desta espécie, que se concentra num número reduzido de locais, aumenta a sua vulnerabilidade.

A destruição de abrigos e a sua perturbação, particularmente durante os períodos de criação e hibernação, são as principais causas de ameaça.

A alteração de habitats de alimentação e o uso generalizado de pesticidas também podem afectar esta espécie.

Medidas de Conservação

Recomenda-se a protecção legal dos abrigos e o encerramento das suas entradas





Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Morcego-de-franja

nas épocas críticas do ano, a gestão do habitat nas áreas envolventes aos seus principais abrigos e a continuação do programa de monitorização das suas populações.

A racionalização do uso de pesticidas e a realização de acções de sensibilização poderão também beneficiar esta espécie.